

Vénák betegségei, visszereesség

Vénás betegségnek nevezzük a visszerek vér továbbító funkciójának elégtelenségét. Ilyenkor a periférián lévő vénákban, pangás lép fel, ezáltal faluk gyengül, kanyargóssá válnak. A lelassult keringés miatt gyulladás és trombózis léphet fel.

A vénáknak két nagy csoportját különböztetjük meg, a felületi, bőr alatt futó és a mély, izmok között elhelyezkedő vénás rendszert. A mélyvénák elzáródásakor a felületen futó vénák kompenzatórikusan kitágulnak.

Főbb tünetek:

Hajszálértágulatok (seprűvénák), kanyargós, felületi vénák, az ún. nehéz-láb tünetek (duzzanat, fájdalom, éjszakai lábikra görcs).

A vénatágulat egyik szövődménye a vénafal gyulladása. Ilyenkor a kitágult véna megkeményedik, fájdalmassá válik, körülötte a bőr meleg lesz és elszíneződik.

Gyakori szövődmény a trombózis, amikor is a vénákban stagnáló vér megalvad, és elzárja az érlument. A mélyen futó vénák trombózisakor a beteg végtagja hirtelen megduzzad, a lábikra fájdalmas és meleg lesz, tapintásra érzékenyvé válik. A kialakult vérrögökből elsodródhat egy rész (embólius) a tüdő artériáiba, és kialakulhat az életveszélyes tüdőembólizáció.

A kezeletlen visszér betegség másik szövődménye a lábszárfekély (ulcus cruris).

A felületes vénák gyulladása jól reagál homeopátiás kezelésre. A mély vénák érintettsége azonban kórházi ápolást tesz szükségessé a trombózis veszélye miatt.

Kezelés: alacsony potenciájú szereket adunk (D4-6, C 5-9), naponta kétszer, háromszor.

AESCULUS

A vénás rendszer egyik legfontosabb homeopátiás szere. A végtagok visszerei bíborvörösek, pattanásig teltek. A duzzadt, fájó lábak, tág visszerek mellett aranyér, bélrenyheség, száraz, kemény széklet jellemzik. A fájdalom tűszúráshoz hasonlít, fokozódik álláskor, forró fürdő után, evés után.

ARNICA

A hajszálerekre és a vénákra ható homeopátiás szer.

A visszereken csomók tapinthatók, melyek igen érzékenyek az érintésre, környezetükben véraláfutások láthatóak. Vörös, forró végtagok, kékes-vörös vénatágulatok. Számatalan hajszálér tágulat, seprűvéna látható. A páciens összetörnek érzi a lábait.

HAMAMELIS

Égő, szúró, sebzéshez hasonlító fájdalom és nyomás érzékenység, sötétkék visszerek, melyek gyulladásra hajlamosak. Könnyen keletkeznek bőr alatti bevérzések. A vénákon csomók, kiöblösödések tapinthatók, melyek nagyon érzékenyek. A beteg úgy érzi, hogy szétpattannak az erei. Panaszaik melegben fokozódnak. A Hamamelis oldat borogatásként is alkalmazható 1: 10 arányban hígítva). A szert belsőleg hosszabb ideig (hetekig, 2-3 napos szünetek beiktatásával) érdemes adagolni.

APIS

Nem csak a vénák, de az egész lábszár nagyfokú duzzanata jellemzi. Az érintett rész felett a bőr halvány piros, feszül, fénylik, gyakran viszket is. A legkisebb érintés is erős fájdalmat okoz, mely szúró, égő jellegű, és hideg borogatástól enyhül.

PULSATILLA

A bőrön kékesen áttűnő vénák, melyekben a vér pang, emiatt a lábak fájdalmasak. Meleg helységben és éjszaka rosszabbodás észlelhető, viszont hűvös levegőn javulás várható. Ha fekély alakul ki, körülötte a bőr márványszerű. A fekély környezete fájdalmasabb, mint maga a fekély. Várandósoknál kialakuló, vagy rosszabbodó visszereesség kezelésére igen alkalmas szer.

SEPIA

A vénák visszaáramlása nehezített. Sötét színű vénák, lefelé húzó fájdalmak, a láb elnehezülése jellemző. Gyakran kíséri a kismedencében érzett lefelé húzó érzés. Éjjel romlik, melegtől és erőteljes mozgástól javul.

VIPERA BERUS

Vérzésre hajlamos, megkeményedett, tág vénák, duzzadt, feszülő, lábszár. A beteg nehéznek érzi a lábát, elviselhetetlen, szaggató fájdalma van, mintha szét akarna „durranni” a lába. Lábszárgörcsök, és a bőr kékes elszíneződése kísérheti. Rosszabbodik függőleges helyzetben, a láb lelógatásakor, hidegtől, időjárás változástól. Javul a lábak felpolcolásától. Trombózis veszély!

LACHESIS

Kékes-vörös, sötét színű vénák, melyek érintésre rendkívül érzékenyek. A beteg nem viseli el a gumiharisnya, rugalmas pólya szorítását. Ha fekély alakul ki, annak alapja piszkos-fekete, széle lilás-kék színű, környezete márványos rajzolatú. Rosszabbodik melegtől, érintéstől. Javul langyos borogatástól. (kezdődő trombózis állhat fenn, orvosi vizsgálat szükséges!)

CROTALUS HORRIDUS

Feketés színű vénaköteg, kiterjedt bőr alatti vérzések, duzzadt környezet, Erős fájdalmak, melyek meleg, nedves időben rosszabbodnak. A panaszok reggel, ébredés után fokozódnak. Általában már trombózis vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn (orvosi vizsgálat szükséges!).

Mivel a visszérbetegség anatómiai elváltozások talaján létrejövő, az egész szervezetet érintő folyamat, mélyreható kezelése, a szövődmények kialakulásának megakadályozása csak az egyénre szabott, **alkati szerrel** lehetséges.

dr. Sebő Zsuzsanna
homeopata, gyermekorvos
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület